



مرکز آموزشی و درمانی
۷۱۴ تختخوابی امام رضا (ع)

کله سیستکتومی لپاراسکوپی (برداشتن کیسه صfra)

آموزش به مددجو

چربی و تنخم مرغ را وارد رژیم غذایی کنید.
**در صورت مشاهده مواد زیر پرستار
یا پزشک را در جریان قرار دهید**

تب (بیش از ۳۷/۵ درجه)
درد غیر طبیعی در شکم
ملتهب شدن ناحیه عمل
احساس سرگیجه و غشن
تهوع و استفراغ
خطرات احتمالی

عوارض مربوط به داروهای بیهودی
عفونت
خونریزی

آسیب به ارگانهای همچو کیسه صfra و
مجاری صفاوی
نشت صfra (در این موارد ممکن است یک لوله
تخلیه در محل عمل گذاشته شود).
توجه: سیستم گوارشی بدون کیسه صfra به
فعالیت معمولی خود ادامه می‌دهد و تنها در
بعضی موارد ممکن است مدفوع نرم داشته باشد.

۲- روش لپاراسکوپی: لپاراسکوپی یکی از
روش‌های برداشتن کیسه صfra به شیوه
لپاراسکوپی است. در این روش که در اتاق عمل
انجام می‌شود، برش‌های کوچکی در زیر ناف
ایجاد می‌شود و کیسه صfra از این طریق خارج
می‌شود. این روش مدت بستتری شدن و دوره
نقاوت کمتری را به دنبال خواهد داشت اگر چه
عوارض جدی که ممکن است همراه با عمل
جراحی باز دیده شود در لپاراسکوپی هم مشاهده
می‌شود.

مراقبت بعد از عمل لپاراسکوپی

۱- به دلیل دستکاری شدن روده‌ها، رژیم
غذایی معمولی را از ۲ روز پس از عمل و به تدریج
آغاز کنید.

۲- ۱ تا ۲ روز بعد می‌توانید دوش بگیرید.

۳- بعد از ۳-۴ روز می‌توانید رانندگی کنید.

۴- تا یک هفته از بلند کردن اجسام سنگین
خودداری کنید.

۵- با آب و صابون ملایم محل عمل را شستشو
دهید.

رژیم غذایی

پس از برداشتن کیسه صfra از یک رژیم غذایی
حاوی پروتئین و کربوهیدراتات مثل برنج، ماکارونی
یا نان، میوه‌های پخته و سبیل زمینی آب پز
استفاده کنید طی ۴ تا ۶ هفته آینده به آرامی

شدن رنگ ادرار می شوند از سوی دیگر مدفوع به علت عدم وجود رنگدانه صفرایی به رنگ خاکستری (رنگ گل رس) در می آید.

تشخیص:

عکس برداری ساده از شکم
سونوگرافی

بررسی مجرای صفرایی و پانکراس به وسیله آندوسکوپی

روش های درمان

برداشتن کیسه صfra از طریق روش های جراحی سنتی به عنوان روش استاندارد برای درمان مورد استفاده بوده است.

۱- روش جراحی باز: مراقبت بعد از عمل جراحی باز : به منظور جلوگیری از جمع شدن ترشحات در ریه به شما توصیه می کنیم که هر چه سریعتر از تخت خارج شوید راه بروید ، سرفه کنید و نفس های عمیق بکشید (صبح روز بعد از عمل می توانید از تخت پایین آمده و را بروید).

۲ - علائم ناشی از انسداد مجرای صفرایی به وسیله سنگ

از جمله این علائم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- درد: در صورت انسداد مجرای صفرایی به وسیله سنگ کیسه صfra متسع و در نهایت دجار التهاب و عفونت می شود معمولاً جند ساعت بعد از خوردن غذای سنگین درد بسیار شدید در يك چهارم فوکانی راست شکم احساس می شود که به پشت و شانه راست گسترش می باید و معمولاً با تهوع و استفراغ همراه است بیمار بی قرار بوده و دائمآ در حال حرکت است گاهی ممکن است درد آن قدر شدید باشد که نیاز به مسکن وجود داشته باشد.

۲- یرقان: بعضی از مبتلایان به بیماری کیسه صfra به علت انسداد مجرای صفرایی دچار یرقان می شوند به این دلیل که صfra به جای تخلیه به درون اثنی عشر وارد خون می شود و در نتیجه پوست و مخاط بیمار زرد رنگ می شوند این حالت معمولاً با خارش شدید پوست همراه است.

۳- تغییر ادرار و مدفوع: ترشح رنگدانه های صفرایی توسط کلیه ها باعث تیره

تعريف

کیسه صfra، کیسه کوچک که از دستگاه گوارش محسوب می باشد. سنگ کیسه صfra شایع ترین دلیل التهاب می باشد. سنگ های کیسه صfra از مواد موجود در صfra تشکیل می شوند که از نظر اندازه، شکل و ترکیب بسیار متنوع می باشند. اما غالباً از کلسیترول ساخته شده اند. کلسیترول در آب نامحلول است و حلایقت چربی آن نیز به اسیدهای صفرایی موجود در صfra بستگی دارد. در افراد مستعد تولید اسیدهای صفرایی در کبد کاهش و تولید کلسیترول افزایش می یابد در نتیجه کلسیترول صfra به حد فوق اشباع می رسد و صfra به شکل سنگ رسوب می کند.

علائم و نشانه ها

در بسیاری از موارد سنگ های کیسه صfra بدون علامت و فاقد درد می باشند که در این صورت به اقدامات درمانی احتیاجی نیست اما به طور معمول دو دسته علائم در این بیماری بوجود می آید:

۱- علائم مربوط به بیماری خود کیسه صfra