



مرکز آموزشی درمانی
۱۵۵ تغذیه‌گردان امام رضا (ع)

رتینوپاتی نوزادان نارس

RETINOPATHY OF PREMATURITY

ارجاع به موقع کودک برای معاينه چشم پزشکی
برابر با **حفظ بینایی کودک** شما می باشد



شماره تماس: ۰۱۰-۰۷۶۷۵۳۰
شماره فاكس: ۰۷۶۷۵۳۰۰۰
نشانی: المکترونیک:
ADMIN@IRHK.IR
WWW.IRHK.IR

آیا پس از درمان باز هم پیگیری لازم است؟
مدت ها پس از درمان، پیگیری ضروری است.

کودکان نارس چه مشکلات بینایی دیگری
دارند؟

کودکان نارس ممکن است به مشکلات مختلفی
مثل انحراف چشم و عیوب انکساری و یا تاخیر در
رشد مرکز بینایی و مشکلات مغزی، که ممکن است
دید کودک را کم کند، گرفتار شوند.



برای جلوگیری از نابینایی چه باید کرد؟

معاینه و درمان به موقع، ۸۵ درصد از کودکان
مبتلارا به طور کامل نجات خواهد داد. گروه کوچکی
از کودکان ممکن است نیاز به درمان های مکرر و
مراجعت بعدی داشته باشند.

این بیماری به هیچ عنوان بدون معاينه
مشخص نمی گردد. عکس العمل کودکان
به نور به هیچ عنوان دلیل بر نداشتن
بیماری نمی باشد.



روش های درمانی چیست؟

در صورتیکه کودک به موقع معاينه و بیماری
تشخيص داده شود، روش استاندارد درمان، لیزر و در
بعضی مواقع تزریق مواد ضد رگ نوساز داخل
چشم ها و در موارد پیشرفته، جراحی های
پیچیده تر می باشد.

چه کودکانی نابینا می شوند؟

همه کودکان نارس به بیماری مبتلا نمی شوند. همه کودکانی که به این بیماری مبتلا می شوند نیاز به درمان ندارند. اما همه کودکان نارس تا کامل شدن عروق شبکیه و از بین رفتن خطر بیماری، باید بطور کامل تحت نظر باشند.

چه اتفاقی در کودکان مبتلا می افتد؟

وقتی عروق شبکیه کامل نیستند، مناطقی که رگ ندارند دچار کمبود اکسیژن می شوند. در اثر این کمبودها، عروق ناجا تشکیل می شود، که نه تنها فایده ای برای شبکیه ندارند، بلکه با خونریزی و کشش بر روی شبکیه منجر به کنده شدن شبکیه و نابینا شدن کودک می شود.

زمان ایجاد بیماری

شایع ترین زمان شیوع بیماری بین ۳۱ تا ۳۳ هفته از شروع حاملگی می باشد، لذا لازم است کودک در ۴ هفته پس از تولد و یا هفته ۳۱ حاملگی، هر کدام دیرتر باشد، توسط یک چشم پزشک ماهر در این زمینه معاینه شود. بدترین اشتباه که در مورد کودکان اتفاق می افتد، عدم ارجاع به موقع کودک به دلیل نامساعد بودن حال عمومی کودک در زمان پستری در بخش مراقبت های ویژه می باشد. معمولاً زمانی حال کودک برای اعزام به چشم پزشکی مساعد می شود که بیماری پیشرفت کرده و شاید دیگر قابل درمان نباشد.

مدت زمان لازم برای تشخیص بیماری

گاهی لازم است کودک بارها و بارها معاینه شود. نوع معاینه و شرایط خاص آن برای والدین، آزاردهنده اما ضروری است.

گاهی ماه ها پیگیری لازم است تا مشخص شود کودک نیاز به درمان دارد یا نه.



بیماری شبکیه کودک نارس چیست؟

شبکیه در چشم، محلی است که تصاویر رؤی آن تشکیل می شود و سپس از طریق عصب بینایی تصاویر به مغز منتقل شده و دیده می شوند. در صورت آسیب به شبکیه، دید بیمار از بین می رود. در کودک نارس، عروق تغذیه کننده شبکیه کامل نیستند و هر چه کودک نارس تر و با وزن کمتر باشد، این نقص بیشتر است. با تولد کودک نارس، هر چه حال عمومی او بدتر باشد و هر چه در زمان بستری مشکلات بیشتری داشته باشد، احتمال وقوع بیماری بیشتر است. زمانی فکر می کردند تنها دلیل ایجاد بیماری، دادن اکسیژن است. اما امروزه می دانند که مهم ترین دلایل بیماری، کم بودن سن حاملگی و کم بودن وزن کودک در زمان تولد است. البته دلایل دیگری هم وجود دارد.

