



برونشیت

آموزش به مددجو

۱۹- از فعالیت در روزهای بسیار گرم یا سرد و در هنگام خستگی و یا روزهای مه آلود باید اجتناب شود.



- ۱۰- از مایعات فراوان استفاده کنید.
- ۱۱- تغذیه بیمار سرشار از ویتامین و پروتئین و سایر مواد غذایی باشد.
- ۱۲- محیط اتاق را مرطوب نگهدارید.
- ۱۳- مصرف داروهای تجویز شده فراموش نشود.
- ۱۴- حمایت روحی - روانی از بیمار بعمل آید.
- ۱۵- از مصرف سیگار جدا خودداری شود و در حضور این بیماران کسی سیگار نکشد.
- ۱۶- بیمار تحت هیچ شرایطی در محیطی که دود وجود دارد قرار نگیرد.
- ۱۷- در صورت وجود دیسترنس تنفسی و سختی در نفس کشیدن، مراجعه سریع به مراکز درمانی ضروری است.
- ۱۸- عدم توانایی در مصرف و جذب مایعات از راه دهان، ادرار تیره رنگ و افزایش ضربان قلب، در صورت بروز این علائم به پزشک خود اطلاع دهید.

برونشیت

تعريف : التهاب راه های هوایی بزرگ مثل برونش و درخت برونژیولی که نتیجه اش تولید موکوس است زمانی که فرد حداقل ۳ ماه در سال، به مدت ۲ سال متوالی به طور مداوم سرفه کند و خلط داشته باشد برونژیت حاد که بوسیله ویرونس ، باکتری یا مسود محرك ایجاد می شود نوع مزمن در اثر قرار گرفتن مکرر در معرض مواد محرك است.

به خروج ترشحات نمی باشد و افزایش ترشحات مانع از تبادلات گازی می شود.

فاکتورهای خطر

- ۱- سیگار
- ۲- شغل
- ۳- آلودگی هوا

نکته

مهتمرين فاكتور خطر سیگار می باشد.

علائم

- سرفه که اين سرفه ها مداوم و خلط دار است.
- خلط صبحگاهی (چرکی و موکوسی)
- تنگی نفس
- به علت فلنج مژکهای تنفسی و متورم شدن مجاري تنفسی بيمار قادر

خلط آسود را جمع آوري کرد تامانع اشتهاي بيمار نشود.

۳- می توان به بيمار آب ميوه بخصوص آب ميوه هاي ترش داد.

۴- هنگام سرفه حتماً يك دستمال جلوی دهان و بینی خود قرار دهيد.

۵- به بيمار آموزش داده شود که خلط خود را خارج كند و به طريق بهداشتی دفع کند.

۶- به بيمار آموزش داده شود که تنفس عميق انجام دهد.

۷- واکسیناسيون انفولاترا انجام دهيد.

۸- به بيمار فيزيوتراپي تنفس آموزش داده شود.

۹- در معرض هوای سرد و خشک قرار نگيريد.

آموزش های ویژه

۱- رعایت بهداشت دهان و تشویق بيمار به مصرف غذاهای مورد علاقه، و بدنیال آن بوی بد دهان ناشی از بی اشتهايی کاهش می یابد.

۲- قبل از صرف غذا باید دستمالهای