



سرطان ریه

تهیه کننده:

رویا اخوان گوران

آموزش به مددجو

مجموعه کتابچه های آموزشی ضمن خدمت
پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

علایم بالینی

- ۱- سرفه یا تغییر در وضعیت سرفه شایع تر است
- ۲- سرفه تک - ممتد و بدون خلط
- ۳- تپ - درد قفسه سینه - سرفه همراه با خلط خونی

تشخیص

- ۱- گرافی سینه - سی تی اسکن سیستولوژی خلط برونکوسکوپی

درمان

جراحی: برداشتن یک لوب یا دو لوب ریه یا
برداشتن کامل ریه بسته به وسعت توده دارد.

پرتو درمانی

- ۱- تومورهای سلولی کوچک و اپیدرموتید
- ۲- کوچک کردن تومور جهت جراحی
- ۳- تخفیف علایم سرفه - درد - تنگی نفس - سرفه همراه با خلط خونی و درد استخوانی

سرطان ریه

تومورهای ریه: ۱- خوش خیم
۲- بدخیم: اولیه از ریه، دیواره قفسه سینه یا مدیاستن ، متاستاز شایعترین است .
سرطان ریه کشنده ترین سرطان است
عامل خطر اصلی سیگار است، سرفه مهمترین علامت است با مشاهده تغییر در سرفه باید به سرطان ریه مشکوک شد .

عوامل خطر

- ۱- دخانیات - زننده - اختلالات تغذیه ای - بیمارهای مزمن انسداد ریه - سل
- ۲- سن: هر چه سن هنگام کشیدن سیگار کمتر باشد خطر سرطان ریه افزایش می یابد .
- ۳- شیوع سرطان در اقوام مبتلایان ۲-۳ برابر است .
- ۴- رادون (غاز بی رنگ و بو) سبب سرطان ریه می شود .
- ۵- مصرف کمتر بتاکلروتن - میوه جات - سبزیجات و ویتامین A

- ۱۳- در معرض هوای سرد و خشک قرار نگیرد . مایعات فراوان مصرف نماید .
- ۱۴- در صورت وجود علایم مثل عدم توانایی در مصرف و جذب مایعات از راه دهان ، ادرار تیره رنگ ، افزایش ضربان قلب ، در صورت سختی نفس کشیدن مراجعه سریع به مراکز درمانی ضروری است
- ۱۵- از فعالیت در روزهای بسیار گرم یا سرد و در هنگام خستگی و با روزهای مه آلود اجتناب شود . تحت هیچ شرایطی در محیط دود آلود قرار نگیرد

- ۴- برای ترک سیگار اقدام کنید و در حضور بیمار کسی سیگار نکشید
- ۵- یاد آوردن اینکه داروهای شیمی درمانی را سر وقت تزریق نماید .
- ۶- آزمایشات بیوشیمی که توسط پزشک داده می شود سر وقت انجام دهید
- ۷- برای ورود و خروج هوا بایستی از سرفه و تنفس عمیق انجام دهید .
- ۸- به خانواده آموزش دهید که بیمار را مورد سرزنش قرار ندهند . امید به زندگی را در او افزایش دهند و حمایت روحی و روانی از بیمار به عمل آید
- ۹- بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید .
- ۱۰- قبل از صرف غذا باید دستمالهای خلط آلود را جمع آوری کرد تا مانع اشتهاهی بیمار نشود .
- ۱۱- هنگام سرفه حتماً یک دستمال جلوی دهان و بینی خود قرار دهید .
- ۱۲- به بیمار آموزش داده شود که خلط خود را خارج و به طریق بهداشتی دفع کند .

شیمی درمانی

- ۱- مکمل جراحی با پرتو درمانی
- ۲- بر طرف کردن درد و افزایش طول عمر بیمار

اموزش به بیمار :

از دست دادن اشتهاه ممکن است به صورت مشکل جدی باعث سوء تغذیه و از دست دادن وزن شود .

- ۱- قبل از وعده های غذایی قدم بزند
- ۲- از نوشیدن مایعات پرهیز کنید
- ۳- در صورت امکان با خانواده و دوستان غذا بخورید با چاشنی زدن وسوس ها غذا را دلچسب کنید . از سبزیجات استفاده کنید هم چنین از آب میوه ترش استفاده کنید ، وعده های غذایی کم حجم و مکرر داشته باشید ، پیشک مکمل های غذایی تجویز کند و انها را به شیر و دسر اضافه کنید ، و تغذیه سرشار از ویتامین و پروتئین و سایر مواد غذایی باشد